

## Detmol - mic

Detmol-mic je mikroenkapsulovaná suspenze určená k aplikaci postřikem, s několikaměsíční účinností na švába obecného, rusa domácího a různé druhy brouků, k aplikaci ve formě bariér proti škodlivým druhům hmyzu, ve vnitřních prostorách budov.

**Účinná látka:** mikroenkapsulovaný fenitrothion 20%

**Pozor:**

R-věty: ---

S-2: Uchovávejte mimo dosah dětí !

S-13: Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv !

S-36/37: Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice !

S-42: Při fumigaci nebo rozprašování používejte ochrannou masku s filtrem A1-P3

**Návod k použití:**

Detmol-mic je mikroenkapsulovaný přípravek. Je-li aplikován na porézní povrch, jeho účinná látka se nevsakuje. Mikroenkapsule zůstávají na povrchu, ulpívají na těle hmyzu a na ošetřeném povrchu zůstávají účinné po dlouhou dobu.

Detmol-mic se pro použití ředí na 1% - 2% pracovní jíchu, tj. do menšího množství vody se přidá 50 ml resp. 100 ml přípravku, dobře se rozmíchá a doplní se vodou do 5-ti litrů. Obsah postřikovače s naředěnou jíchou je nutné každých 15 minut důkladně protřepat, aby se zabránilo usazování. Nejvhodnější tlak v postřikovači je 2 bary.

U balení s dávkovacím zařízením to představuje 2 resp. 4 odměrky po 25 ml. Dávkuje se tak, že se uvolní červený uzávěr, láhev se opatrně stlačuje, až se dávkovací nádobka zaplní po okraj. Přebytek steče zpět do láhve.

Při prvním zásahu v objektech zamořených rusem domácím nebo švábem obecným a pro dlouhodobější účinnost lze použít 3% pracovní jíchu. Postřik se aplikuje na všechna místa, kde se hmyz ve dne a v noci může vyskytovat. Základní dávkování postřiku je 50 ml na plošný metr, na porézním povrchu se spotřeba postřikové látky může zvýšit až na 100 ml na plošný metr. Ze svislých ploch nesmí postřik stékat.

Rusi a švábi:

Rus domácí: Aplikaci přípravku je nutné opakovat v plném rozsahu po 5-ti týdnech.

Šváb obecný: Aplikaci je nutné opakovat v plném rozsahu po 5-ti měsících.

**Bezpečnostní opatření:**

Při práci s přípravkem se používá ochranný oděv Unita či Lesan, ochranný obličejový štít SP-15 nebo D-1 s čepcem a gumové rukavice, případně dostupné schválené ekvivalenty. Při aplikaci přípravku se smí v místnosti zdržovat pouze osoby, které provádějí dezinfekci. Všechny nedostatečně zabalené potraviny, krmiva, hračky, používané nádoby a také domácí zvířata je nutné odstranit z místnosti ještě před vlastní aplikací přípravku. Všechny stoly, pracovní desky a plochy, na kterých se

ukládají nebo zpracovávají potraviny nebo které přicházejí do styku s pokožkou, je třeba dostatečně přikrýt a po aplikaci přípravku důkladně omýt alkalickým čistícím prostředkem. Nestříkat na koberce a textilní podlahové krytiny. Je nutné zabránit přímému kontaktu s čerstvě nastříkaným a nedostatečně zaschlým povrchem. Nestříkat na nechráněné elektrické vodiče, přístroje a vypínače. Až do důkladného zaschnutí naneseného přípravku dobře větrat.

Při práci dodržujte zákaz jídla, pití a kouření. Před jídlem a po skončení práce se důkladně omyjte teplou vodou a mýdlem. Zbytky postřikové kapaliny a oplachové vody se nesmí vylévat v blízkosti zdrojů vod a recipientů povrchových vod.

**První pomoc:**

V případě požití vypít 1/2 litru vlažné vody, případně s 10 tabletami medicínálního uhlí a drážděním hrdla vyvolat zvracení. Postiženého dopravit k lékaři.

***Při zasažení oka:***

Vypláchnout proudem čisté vody po dobu nejméně 15 minut a vyhledat lékaře, zejména pokud přetrvává podráždění.

***Při podráždění pokožky:***

Odstranit potřísněný oděv, zasažená místa umýt teplou vodou s mýdlem.

***Při nadýchání:***

Přerušit práci, odejít na čerstvý vzduch, zajistit klidovou polohu a chránit před chladem.

V případě požití a ve všech případech otravy nebo podezření na otravu neprodleně vyhledat lékařskou pomoc. Lékaře informovat o přípravku se kterým postižený pracoval a o poskytnuté první pomoci.

V případě potřeby lze terapii konzultovat s toxikologickým informačním střediskem: Vyšehradská 49, 128 21 Praha 2, tel.: 02-24919293.

**Skladování:**

Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech v suchých uzamykatelných skladech, odděleně od potravin a krmiv. Chraňte před mrazem.

**Likvidace obalů:**

Prázdné obaly se po důkladném vypláchnutí a znehodnocení mohou předat do sběru k recyklaci nebo se spálí ve schválené spalovně.

**Balení:**

Dávkovací láhev z umělé hmoty o obsahu 500 ml  
Plastikový obal o obsahu 5 l

**Výrobce:** Frowein GmbH, SRN

**Pro ČR registruje výhradní dodavatel:**

de Wolf 3xD, s.r.o., Mánesova 26, 350 02 Cheb