

Detmol - pro

Detmol-pro je vodou ředitelná mikroenkapsulovaná suspenze určená k aplikaci postřikem, s několikaměsíční účinností na švába obecného, rusa domácího, blechy, různé druhy brouků, k aplikaci ve formě bariér proti mravencům a proti dalším škodlivým druhům hmyzu, ve vnitřních prostorách budov.

Účinná látka: mikroenkapsulovaný chlorpyrifos 23,1%

Pozor:

R-věry: ---

S-2: Uchovávejte mimo dosah dětí !

S-13: Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv !

S-36/37: Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice !

S-42: Při fumigaci nebo rozprašování používejte ochrannou masku s filtrem A1-P3

Návod k použití:

Detmol-pro je mikroenkapsulovaný přípravek. Je-li aplikován na porézní povrch, jeho účinná látka se nevsakuje. Mikrokapsule zůstávají na povrchu, ulpívají na těle hmyzu a na ošetřeném povrchu zůstávají účinné po dlouhou dobu.

Detmol-pro se pro použití ředí na 1% pracovní jíchou, t.j. do menšího množství vody se přidá 50 ml přípravku, dobře se rozmíchá a doplní se vodou do 5-ti litrů. Obsah postřikovače s naředěnou jíchou je nutné každých 15 minut důkladně protřepat, aby se zabránilo usazování. Nejvhodnější tlak v postřikovači je 2 bary.

U balení s dávkovacím zařízením to představuje 2 odměrky po 25 ml. Dávkuje se tak, že se uvolní červený úzávěr, láhev se opatrně stlačuje, až se dávkovací nádobka zaplní po okraj. Přebytek steče zpět do láhve.

Při prvním zásahu v objektech zamořených rusem domácím nebo švábem obecným a pro dlouhodobější účinnost lze použít 2% pracovní jichu (t.j. 100 ml přípravku do 5 l vody). Postřik se aplikuje na všechna místa, kde se hmyz ve dne a v noci může vyskytovat. Základní dávkování postřiku je 50 ml na 1 plošný metr. Ze svislých ploch nesmí postřik stékat.

Rusi a švábi:

Rus domácí: Aplikaci přípravku je nutné opakovat v plném rozsahu po 5-ti týdnech.

Šváb obecný: Aplikaci je nutné opakovat v plném rozsahu po 5-ti měsících.

Blechy:

Před vlastní aplikací přípravku je nutné vysavačem důkladně vyčistit podlahy, koberce, čalouněný nábytek a pod. Postřik se aplikuje na všechna místa, kde se blechy vyskytují.

Po několika týdnech celý proces zopakovat. Zvláštní pozornost věnovat místům, kde se zdržují a přebývají domácí zvířata. Domácí zvířata nechat prohlédnout a ošetřit zvěrolékařem.

Bezpečnostní opatření:

Při práci s přípravkem se používá ochranný oděv Unita či Lesan, ochranný obličejový štít ŠP-15 nebo D-1 s čepcem, gumové rukavice a gumové boty, případně dostupné schválené ekvivalenty. Při aplikaci přípravku se smí v místnosti zdržovat pouze

osoby, které provádějí dezinfekci. Všechny nedostatečně zabalené potraviny, krmiva, hračky, používané nádoby a také domácí zvířata je nutné odstranit z místnosti ještě před aplikací přípravku. Všechny stoly, pracovní desky a plochy, na kterých se ukládají nebo zpracovávají potraviny nebo které přicházejí do styku s pokožkou, je třeba dostatečně přikrýt a po aplikaci přípravku omýt alkalickým čistícím prostředkem. Nestříkat na koberce a textilní podlahové krytiny. Je nutné zabránit přímému kontaktu s čerstvě nastříkaným a nedostatečně zaschlým povrchem. Nestříkat na nechráněné elektrické vodiče, přístroje a vypínače. Až do důkladného zaschnutí naneseného přípravku dobře větrat. Při práci dodržujte zákaz jídla, pití a kouření. Před jídlem a po skončení práce se důkladně omyjte mýdlem a teplou vodou. Zbytky postřikové kapaliny a oplachové vody se nesmí vylévat v blízkosti zdrojů vod a recipientů povrchových vod.

První pomoc:

V případě požití vypít 1/2 litru vlažné vody, případně s 10 tabletami medicínálního uhlí a drážděním hrdla vyvolat zvracení. Postiženého dopravit k lékaři.

Při zasažení oka:

Vypláchnout proudem čisté vody po dobu nejméně 15 minut a vyhledat lékaře, zejména pokud přetrvává podráždění.

Při zasažení pokožky:

Odstranit potřísněný oděv, zasažená místa umýt teplou vodou a mýdlem.

Při nadýchání:

Přerušit práci, odejít na čerstvý vzduch, zajistit klidovou polohu a chránit před chladem.

V případě požití a ve všech případech otravy nebo podezření na otravu neprodleně vyhledat lékařskou pomoc. Lékaře informovat o přípravku se kterým postižený pracoval a o poskytnuté první pomoci.

V případě potřeby lze terapii konzultovat s toxikologickým informačním střediskem: Vyšehradská 49, 128 21 Praha 2, tel.: 02-24919293

Skladování:

Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech v suchých uzamykatelných skladech, odděleně od potravin a krmiv. Chránit před mrazem.

Likvidace obalů:

Prázdné obaly se po důkladném vypláchnutí a znehodnocení mohou předat do sběru k recyklaci nebo se spálí ve schválené spalovně.

Balení:

Dávkovací láhev z umělé hmoty o obsahu 500 ml
Plastikový obal o obsahu 5 l

Výrobce: Frowein GmbH, SRN

Pro ČR registruje výhradní dodavatel:

de Wolf 3xD, s.r.o., Mánesova 26, 350 02 Cheb